

コセルゴ®特定使用成績調査 神経線維腫症1型における叢状神経線維腫に関する全例調査
副作用の発現状況

このWeb サイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性のある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

副作用の種類	本剤投与症例		
	副作用 例数 (%)	重篤な副作用 例数 (%)	非重篤な副作用 例数 (%)
調査票固定例数	68		
発現例数	59 (86.8)	10 (14.7)	58 (85.3)
感染症および寄生虫症	12 (17.6)	2 (2.9)	10 (14.7)
爪囲炎	10 (14.7)	2 (2.9)	8 (11.8)
インフルエンザ	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.9)
蜂巣炎	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
上咽頭炎	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
悪性新生物進行	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
血液およびリンパ系障害	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
貧血	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
免疫系障害	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
季節性アレルギー	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
代謝および栄養障害	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
高尿酸血症	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
神経系障害	5 (7.4)	1 (1.5)	4 (5.9)
頭痛	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.9)
同名性半盲	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
もやもや病	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
傾眠	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
眼障害	3 (4.4)	1 (1.5)	2 (2.9)
霰粒腫	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
漿液性網膜剥離	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
ぶどう膜炎	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
視力低下	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	3 (4.4)	1 (1.5)	2 (2.9)
喘息	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
鼻出血	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
気胸	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
胃腸障害	35 (51.5)	2 (2.9)	34 (50.0)
下痢	18 (26.5)	1 (1.5)	17 (25.0)
腹痛	9 (13.2)	0 (0.0)	9 (13.2)
悪心	8 (11.8)	1 (1.5)	7 (10.3)
口内炎	8 (11.8)	0 (0.0)	8 (11.8)
嘔吐	5 (7.4)	0 (0.0)	5 (7.4)
便秘	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.9)
アフタ性潰瘍	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
口唇炎	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
おくび	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
血便排泄	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
糞径ヘルニア	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
肝胆道系障害	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
肝機能異常	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
皮膚および皮下組織障害	42 (61.8)	1 (1.5)	41 (60.3)
ざ瘡様皮膚炎	18 (26.5)	1 (1.5)	17 (25.0)
皮膚炎	7 (10.3)	0 (0.0)	7 (10.3)
湿疹	7 (10.3)	0 (0.0)	7 (10.3)
脱毛症	6 (8.8)	0 (0.0)	6 (8.8)
ざ瘡	5 (7.4)	0 (0.0)	5 (7.4)
発疹	4 (5.9)	0 (0.0)	4 (5.9)
皮膚乾燥	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
皮脂欠乏性湿疹	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
毛髪変色	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
光線過敏性反応	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
そう痒症	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
紅斑性皮膚疹	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
そう痒性皮膚疹	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
皮脂欠乏症	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
筋骨格系および結合組織障害	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
筋肉痛	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
先天性、家族性および遺伝性障害	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
神経線維腫症	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
一般・全身障害および投与部位の状態	7 (10.3)	1 (1.5)	6 (8.8)
倦怠感	4 (5.9)	1 (1.5)	3 (4.4)
胸部不快感	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
末梢性浮腫	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
疼痛	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)
発熱	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)

副作用の種類	本剤投与症例		
	副作用 例数 (%)	重篤な副作用 例数 (%)	非重篤な副作用 例数 (%)
臨床検査	17 (25.0)	3 (4.4)	15 (22.1)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	12 (17.6)	3 (4.4)	9 (13.2)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2 (2.9)	0 (0.0)	2 (2.9)
好酸球数増加	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
血小板数減少	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
白血球数増加	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
駆出率減少	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)
尿潜血陽性	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)

※1 今後の調査により内容が変更となる場合があります。