

コセルゴ[®]特定使用成績調査 神経線維腫症1型における叢状神経線維腫に関する全例調査
重篤副作用ラインリスト

このWeb サイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のペネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
1	女	20歳代	なし	爪開炎	4	回復	あり
2	女	10歳代	先天性漏斗胸、側弯症	漿液性網膜剥離 ぶどう膜炎	169 169	軽快 軽快	あり あり
3	女	10歳代	近視、斜視	肝機能異常	27	軽快	あり
4	女	10歳代	精神病的行動、腸回転異常	神経線維腫症 悪性新生物進行	128 128	死亡 死亡	あり あり
5	女	10歳代	弱視、アトピー性皮膚炎、もやもや病	もやもや病	3	回復	あり
6	女	10歳代	なし	ざ瘡様皮膚炎 爪開炎	30 213	軽快 軽快	あり あり
				血中クレアチンホスホキナーゼ増加	269	回復	あり
7	女	10歳未満	なし	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	79	回復	あり
8	男	10歳未満	屈折弱視	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	261	回復	あり
9	男	10歳代	喘息、アトピー性皮膚炎、知的能力障害	峠径ヘルニア	309	回復	あり
10	男	10歳代	片頭痛、側弯症、注意欠如・多動性障害	下痢 倦怠感 悪心 疼痛 気胸	2 2 2 2 80	回復 回復 回復 回復 回復	あり あり あり あり あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。